

## قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

نام عمومی		نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	بیماری	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ ثبت
اپوكسی کونازول+تیوفانات متیل	۱	رکس دو	%۴۹/۷	SC	ب آ اس اف	بیماری فوزاریمی سنبله	گندم	روز ۴۲	۰/۵ لیتر در هکtar	۹۲/۳/۲۷
اپوكسی کونازول+تیوفانات متیل		رکس دو	%۴۹/۷	SC	ب آ اس اف	زنگ رزد	گندم	روز ۴۲	۰/۵ لیتر در هکtar	۹۶/۶/۲۷
اپوكسی کونازول+تیوفانات متیل		رکس دو	%۴۹/۷	SC	ب آ اس اف	سفیدک پودری	چخندر قند		۰/۵ لیتر در هکtar	۹۷/۷/۱۶
آزوکسی استروبین + دیفنو کونازول	۲	ارتیواتاپ	%۳۲/۵	SC	سینجننا	سفیدک پودری	جالیز- خیار: ۲ روز مزرعه. گلخانه گوجه: فرنگی: ۰/۷۵ در هزار روز	مزرعه: یک لیتر در هکtar گلخانه: ۰/۷۵ در هزار	-	۸۸/۹/۳۰
آزوکسی استروبین + دیفنو کونازول	۳	سفیر	%۳۲/۵	SC	بارزگانان سرای سپند	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	۹۷/۷/۱۶
آزوکسی استروبین + دیفنو کونازول	۴	دیفوروبین	%۳۲/۵	SC	کاوش کیمیای کرمان	سفیدک پودری	خیار گلخانه	-	۰/۷۵ در هزار حداکثر دو بار سمپاشی	۹۷/۷/۱۶
آزوکسی استروبین + سیپرو کونازول	۵	آمیستراکسترا	%۲۸	SC	سینجننا	زنگ زرد	گندم	روز ۳۵	۰/۷۵ لیتر در هکtar	۹۲/۸/۲۷

## فارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

۹۲/۸/۲۷	۰ لیتر در هکتار /۶	روز ۳۰	گندم	زنگ زرد	بایراً گ	EC	% .۴۶	فالکن	اسپیروکسامین+تبو کونازول+تریادیمنول	۶
۹۴/۳/۲۵	۰ لیتر در هکتار /۷-۰/۸	روز ۳۰	گندم	فوزاریوم سنبله	بایراً گ	EC	% .۴۶	فالکن	اسپیروکسامین+تبو کونازول+تریادیمنول	
۹۴/۶/۲۳	۳ کیلو گرم در هکتار	روز ۵	خیار	سفیدک داخلی	اگریا	WP	% .۴۳/۹۵	کوبروسیت سی	اکسی کلرور مس+سیمو کسانیل	۷
۹۱/۶/۲۰	۱ در هزار	روز ۱۵	درختان میوه دانه دار	آتشک	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	% .۷۵	نوردوکس	اکسید مس	۸
۹۰/۴/۱۳	۲/۵ در هزار	روز ۱۵	هلو	پیچیدگی برگ	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	% .۷۵	نوردوکس	اکسید مس	
۹۴/۷/۶	۱ کیلوگرم در هکتار	روز ۱۵	سبب زمینی	سفیدک داخلی	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	% .۷۵	نوردوکس	اکسید مس	
۹۶/۴/۱۹	۱۳۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	-----	برنج	پوسیدگی طوقه و ریشه برنج	نوردوکس آ.اس نروژ	WG	% .۷۵	نوردوکس	اکسید مس	
۹۷/۱۰/۱۷	۰ در هزار استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از چهار نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	روز ۱	خیار(فضای باز و گلخانه)	سفیدک کرکی	ب آ اس اف	SC	۵۲۵	اوروگو	آتوکترادین+دیمتومورف	۹
۸۶/۱۰/۱۰	٪/۲ وزن غده	-----	سبب زمینی	شانکر ریزو کتونیایی ساقه و شوره سیاه غده	بایر آگ	WP	% .۵۰	رورال	ایپرودیون	۱۰

## قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

۹۶/۳/۱	۱/۲۵ لیتر در هکتار	۱۴ روز	برنج	پلاست	نیهون نوهیاکو	EC	٪۴۰	فوجی وان	ایزوپروتیولون	۱۱
۹۲/۴/۱۷	۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار	۱ روز	خیار	سفیدک پودری	نیپون سودا	WP	٪۴۰	بلکیوت	ایمنو کتادین تریس	۱۲
۹۳/۳/۱۲	۷۵۰ گرم در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	لکه موجی (آلترناریا)	نیپون سودا	WP	٪۴۰	بلیکوت	ایمنو کتادین تریس	
۹۵/۸/۲۴	۰/۷۵ در هزار	۷ روز	انگور	سفیدک پودری	نیپون سودا	WP	٪۴۰	بلیکوت	ایمنو کتادین تریس	
۹۳/۱۲/۴	۱۰ در هزار دو مرحله	۷ روز	زردآلو	بیماری غربالی	سبزآور پریدیس	SC	٪۱۸	میشو بردوکس	بردو	۱۳
۹۴/۱۰/۷	۲ درصد محلول پاشی توأم با پانسمان شانکر با بردو کیمیا درصد ۸	۷ روز	درخت سیب	شانکر سیتوسپرایی	کاوش کیمیا کرمان	SC	٪۱۸	بردو کیمیا	بردو	۱۴
۹۶/۱۱/۱۶	۱۰ در هزار	۷ روز	زردآلو	غربالی	البرز بهسمن	SC	٪۱۸	بردو بهسمن	بردو	۱۵
۹۶/۲/۲۵	۸ در هزار در مرحله جوانه و ۵ در هزار در مرحله ۵ درصد، درصد و ۱۰۰ درصد گل	۷ روز	درختان میوه دانه دار	آتشک	سبزآور نگین فلات	SC	٪۱۸	بردوسیف	بردو	۱۶
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار		خیار(گلخانه)	سفیدک کرکی	سبزآور نگین فلات	SC	٪۱۸	بردوسیف		

## قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

۹۸/۳/۲۷	۸ در هزار		هلو	پیچیدگی برگ	سیزآور نگین فلات	SC	٪۱۸	بردوسیف		
۹۶/۳/۱	۵-۸ در هزار در زمان ریزش برگ ها در پاییز و تورم جواندها در بهار	۷ روز	هلو	پیچیدگی برگ	سمیران	SC	٪۲۰	بردو سمیران	بردو	۱۷
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک کرکی	اکسین شیمی آدان	SC	٪۲۰	بردوکسین	بردو	۱۸
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک کرکی	پرتوнаر	SC	٪۲۰	بردوتکس	بردو	۱۹
۹۸/۳/۲۷	۹ در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	پرتونار	SC	٪۲۰	بردوتکس		
۹۷/۳/۲۸	۵ در هزار	۷ روز	گوجه فرنگی	سفیدک کرکی	باغبان تاک	SC	٪۱۸	بردوفیکس	بردو	۲۰
۹۷/۸/۱۴	۱۰ در هزار در مرحله جوانه و ۴ در هزار در مراحا، ۵۰ و ۱۰۰ درصد گل	۷ روز	دانه دار	آتشک درختان میوه	باغبان تاک	SC	٪۱۸	بردوفیکس		
۹۸/۳/۲۷	۲/۵ در هزار	-	انگور	سفیدک سطحی	باغبان تاک	SC	٪۸۰	سولفیکس		
۹۸/۳/۲۷	۱۰ در هزار	-	هلو	پیچیدگی برگ	باغبان تاک	SC	٪۱۸	بردوفیکس		
۹۷/۹/۲۶	۵ در هزار	-	خیار(گلخانه)	سفیدک کرکی	باغبان تاک	SC	٪۱۸	بردوفیکس		
۹۷/۱۲/۱۳	۹ در هزار	-	زردالو	عربالی	گیاه	SC	٪۲۰	بردوچی	بردو	۲۱
۸۹/۹/۲۹	۰/۷ در هزار مناطق خشک، ۱ در هزار	۷ روز	هلو-شلیل	سفیدک سطحی	ب آ اس اف	WG	٪۳۸	بلیس	بوسکالید+پیراکلواستروبین	۲۲

## قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

ردیف	نام و نکات	تاریخ ثبت	مقدار	جنس	نوع	حالت	دسته	٪	نام	لینک
۲۳	بوسکالید+پیراکلوستروبین	۹۷/۱۲/۱۳	۷/در هزار و در تناوب با سایر قارچ کش ها و حداکثر دوبار در سال	-	سیب درختی	سفیدک پودری	ب آ اس اف	WG	%۳۸	بلیس
۲۴	بوسکالید+پیراکلوستروبین	۹۴/۱۲/۱۰	۵/کیلوگرم در هکتار	۳ روز	پودری گوجه فرنگی	آلترناریا	ب آ اس اف	WG	%۳۳/۴	سیگنوم
		۹۵/۳/۱۷	۵/۰ کیلوگرم در هکتار	۳ روز	سیب زمینی	آلترناریا	ب آ اس اف	WG	%۳۳/۴	سیگنوم
۲۵	بوسکالید+کرزوکسیم متیل	۹۸/۱۱/۲۸	۵/۱ در هزار و در تناوب با سایر قارچ کش ها و حداکثر دوبار در سال	۳ روز	توت فرنگی گلخانه	کپک خاکستری	ب آ اس اف	WG	%۳۳/۴	سیگنوم
		۸۹/۹/۲۹	۵/۰ در هزار	۷ روز	هلو-شلیل	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	%۳۰	کولیس
۲۶	بوسکالید+کرزوکسیم متیل	۹۶/۹/۱۳	۴/۰ در هزار	-	خیار	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۳۰٪	کولیس
		۹۸/۴/۱۰	۵/۰ در هزار	-	گوجه فرنگی (فضای باز)	سفیدک پودری	ب آ اس اف	SC	۳۰٪	کولیس
۲۶	بی کربنات پتابسیم	۹۰/۱۲/۱	۵ در هزار	-	جالیز-	سفیدک پودری	کیمیاسیز آور	SP	%۸۵	کالابیان

## قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

			گلخانه							
۹۷/۱۲/۱۳	یک لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	بهارشیمی(آستک)	EC	٪۲۵	بهتیل	پروپیکونازول	۲۷
۸۹/۳/۱۰	۱۰-۱۵ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	بایر آ گ	FS	٪۴۰	لاماردور	پروتیوکونازول + تبوکونازول	۲۸
۸۹/۹/۱	۲۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک آشکار	بایر آ گ	FS	٪۴۰	لاماردور	پروتیوکونازول + تبوکونازول	
۹۶/۴/۱۹	۱۵ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	بایر آ گ	FS	٪۴۰	لاماردور	پروتیوکونازول + تبوکونازول	
۹۲/۷/۸	۳ لیتر در هکتار در مزروعه به صورت شنسی در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۰/۳ لیتر در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۳ روز	خیار	بوته میری	بایر آ گ	SL	٪۸۴	پرویکورانژی	پروپاموکarb هیدرو کلراید و فوزتیل آلومینیوم	۲۹
۹۲/۸/۲۷	۲ در هزار	۱ روز	- خیار گلخانه	سفیدک داخلی	بایر آ گ	SC	٪۶۸/٪۷۵	اینفینیتو	پروپامو کاب هیدروکلراید + فلوبیکولید	۳۰

## قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

۹۴/۷/۶	۱/۲ لیتر در هکتار	۷ روز	سیب زمینی	سفیدک داخلی	باير آگ	SC	%۶۸/۷۵	اینفینیتو	پروپامو کارب هیدروکلراید+فلوپیکولید	
۹۴/۷/۶	۲/۵ لیتر در هکتار	-	سیب زمینی	سفیدک داخلی	اگریفار	SC	%۴۵	پروکسانیل	پروپامو کارب هیدروکلراید+سیموکسانیل	۳۱
۹۶/۱۱/۳۰	۱ در هزار در زمان کشت بذر و انتقال نشا و ۰/۷۵ در هزار دوهفته پس از انتقال نشا	-	خیار	بوته میری <i>Pythiumaphnidermatum</i>	اگریفار	SL	%۷۲/۲	پروپلت	پروپامو کارب هیدروکلراید	۳۲
۹۷/۱۲/۱۳	نیم لیتر در هکتار		گندم	زنگ زرد	ب آ اس اف	EC	%۳۵/۵	اینور	پروپیکونوازول+فلوکسایپروکساد+پیراکلواستروبین	۳۳
۹۲/۸/۲۷	۰/۹ گرم در هر متر مربع	-	قارچ خوارکی	پوسیدگی خشک	فرتی اگرو	WP	%۵۰	آکورد	پروکلراز	۳۴
۸۶/۲/۳	۱/۲۵ در هزار (ضد عفنونی بذر)	-	سیب زمینی	شانکر ریزوکتونیایی ساقه و شوره سیاه غده	باير آگ	WP	%۲۵	مونسرن	پنسیکرون	۳۵
۹۷/۱۰/۱۷	۰/۳۵ در هزار(بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	-	خیار(گلخانه)	سفیدک کرکی	چیانگ سوگرین سای(برزگر برجسته)	DF	%۱۸/۷	پیرادیم	پیراکلواستروبین+دیتمومورف	۳۶
۹۸/۱۰/۲۳	یک در هزار		گوجه فرنگی (مزرعه)	سفیدک پودری	بازرگانان سرای سپند پارس	WG	%۳۸	یونیلیس	پیراکلواستروبین + بوسکالید	۳۷

## قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

پیری متابیل	۴۸	تبوکونازول	فولیکور	٪.۲۵	باير آ گ	پوسیدگی اسکلروتنیابی	ساقه کلزا	-	توب فرنگی گلخانه	کپ خاکستری	گیاه پرینیان اطلس (Safa Tarim)	SC	٪.۳۰	میلیس	پیری متابیل	۴۷						
تبوکونازول	۳۹	تبوکونازول	تبوکونازول	٪.۶	بیسترفیلد	سیاهک پنهان معمولی	گندم	-	۱ لیتر در هکتار	یک در هزار و در تناب و با سایر قارچ- کشها و حداکثر دوبار در سال	-	-	-	توب فرنگی گلخانه	کپ خاکستری	گیاه پرینیان اطلس (Safa Tarim)	SC	٪.۳۰	میلیس	پیری متابیل	۴۸	
تبوکونازول	۴۰	تبوکونازول	آرتیمیس	٪.۲۵	EW	باير آ گ	پوسیدگی اسکلروتنیابی	ساقه کلزا	-	۱ لیتر در هکتار	۵۰ میلی لیتر برای یکصد کیلومتر بذر	-	-	-	توب فرنگی گلخانه	کپ خاکستری	گیاه پرینیان اطلس (Safa Tarim)	SC	٪.۳۰	میلیس	پیری متابیل	۴۷
تبوکونازول	۴۱	تبوکونازول	تبوکور	٪.۲۵	EW	زنگ زرد	گندم	-	یک لیتر در هکتار	یک لیتر در هکتار	-	-	-	توب فرنگی گلخانه	کپ خاکستری	گیاه پرینیان اطلس (Safa Tarim)	SC	٪.۳۰	میلیس	پیری متابیل	۴۸	
تبوکونازول	۴۲	تبوکونازول	تایدیتو	٪.۴۰	SC	زنگ زرد	گندم	-	۱/۴ لیتر در هکتار	۱ لیتر در هکتار	-	-	-	توب فرنگی گلخانه	کپ خاکستری	گیاه پرینیان اطلس (Safa Tarim)	SC	٪.۳۰	میلیس	پیری متابیل	۴۷	
تبوکونازول	۴۳	تبوکونازول	دومارک	٪.۱۰	EC	ایزاگرو	سفیدک پودری	جالیز	۰/۵ لیتر در هکتار در مزرعه و ۰/۴ در هزار در گلخانه	۰/۵ لیتر در هکتار در مزرعه و ۰/۴ در هزار در گلخانه	۳ روز	-	-	توب فرنگی گلخانه	کپ خاکستری	گیاه پرینیان اطلس (Safa Tarim)	SC	٪.۳۰	میلیس	پیری متابیل	۴۸	
تبوکونازول	۴۴	تبوکونازول	دومارک	٪.۱۰	EC	ایزاگرو	سفیدک پودری	سیب	۰/۳ در هزار	۰/۳ در هزار	۱۴ روز	-	-	توب فرنگی گلخانه	کپ خاکستری	گیاه پرینیان اطلس (Safa Tarim)	SC	٪.۳۰	میلیس	پیری متابیل	۴۷	
تبوکونازول	۴۵	تبوکونازول	لوسپل	٪.۱۲/۵	LS	ایزاگرو	سیاهک آشکار	گندم	۱۰۰ میلی لیتر برای ۱۰۰ میلی لیتر برای	۱۰۰ میلی لیتر برای ۱۰۰ میلی لیتر برای	-	-	-	توب فرنگی گلخانه	کپ خاکستری	گیاه پرینیان اطلس (Safa Tarim)	SC	٪.۳۰	میلیس	پیری متابیل	۴۸	

## قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

	یکصد کیلوگرم بذر									
۸۹/۱۰/۱۳	۳۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک پنهان	ایزاگرو	LS	%۱۲/۵	لوسپل	تبوکونازول	
۹۰/۷/۴	۰-۱ لیتر در هکتار	۲۱ روز	چغندر قند	سفیدک پودری	ایزاگرو	ME	%۱۲/۵	امی ننت	تتراکونازول	۴۵
۸۹/۳/۱۰	۱۵۰ گرم برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	باير آ گ	DS	%۷/۵	بایتان	تربادیمنول	۴۶
۸۹/۳/۱۰	۲۰ میلی لیتر برای ضد عفونی یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	ب آ اس اف	FS	%۲۰	رئال	تری تیکونازول	۴۷
۸۸/۸/۱۱	۲۰۰ گرم در هکتار	۱ روز	جالیز- مزروعه	سفیدک پودری	باير آ گ	WG	%۵۰	فلینت	تری فلوكسی استروبین	۴۸
۹۶/۵/۲	۲۵۰ گرم در هکتار	۱ روز	گوجه- فرنگی- مزروعه	سفیدک پودری	باير آ گ	WG	%۵۰	فلینت	تری فلوكسی استروبین	
۹۲/۳/۶	۱۶۰ گرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	بلاست	باير آ گ	WG	%۷۵	ناتیوو	تری فلوكسی استروبین + تبوکونازول	۴۹
۹۴/۵/۱۲	۰/۲۰-۰/۳ در هزار	۱۴ روز	سیب	لکه سیاه	باير آ گ	WG	%۷۵	ناتیوو	تری فلوكسی استروبین + تبوکونازول	
۹۵/۶/۱	۰/۳ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	باير آ گ	WG	%۷۵	ناتیوو	تری فلوكسی استروبین + تبوکونازول	
۹۵/۶/۱	۲۰۰ گرم در هکتار	-	چغندر قند	سفیدک پودری	باير آ گ	WG	%۷۵	ناتیوو	تری فلوكسی استروبین + تبوکونازول	

## قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

۹۶/۹/۱۳	۱۶۰ گرم در هکتار	۲۱ روز	برنج	شیت بلاست	باير آگ	WG	٪۷۵	ناتیبو	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	
۹۸/۱۱/۱۴	۱۶۰ گرم در هکتار	-	برنج	بلاست	بازرگانان سرای سپند پارس CAC ) (Nantong	WG	٪۷۵	فلونازول	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۵۰
۹۸/۱۱/۱۴	۱۶۰ گرم در هکتار	-	برنج	بلاست	پاک سم ایرانیان Sunjo& CAC ) (Nantong	WG	٪۷۵	تیلما	تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول	۵۱
۹۶/۲/۲۵	۰/۲ در هزار	۱۴ روز	سیب	سفیدک پودری	باير آگ	SC	٪۵۰	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوبیرام	۵۲
۹۶/۳/۱	۰/۲ در هزار	۱۴ روز	سیب	لکه سیاه	باير آگ	SC	٪۵۰	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوبیرام	
۹۶/۳/۱	۰/۲ در هزار	۳ روز	خیار-گلخانه	سفیدک پودری	باير آگ	SC	٪۵۰	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوبیرام	
۹۶/۵/۲	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۵ روز	گوجه فرنگی- مزرعه	سفیدک پودری	باير آگ	SC	٪۵۰	لونا سن سیشن	تری فلوکسی استروبین + فلوبیرام	
۹۶/۱۱/۳۰	۰/۳ در هزار	-	بادام	لکه آجری	سومیتومو	DC	٪۱۹	سپرول	تریفورین	۵۳
۹۸/۱۲/۲۸	۰/۴ تا نیم در هزار	-	گندم	سیاهک پنهان معمولی	ب آ اس اف	FS	٪۱۲	اینشورپرفرم	تریتیوکونازول + پیراکلواستروبین	۵۴
۸۰/۳/۲۱	-	-	مرکبات	انبارداری	---	WAX	٪۰/۷	سیترازول آ	نیابندازول + ایمازالیل	۵۵

## قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

۹۰/۳/۳۰	۰/۵-۰/۴ کیلوگرم در هکتار	روز ۲۱	برنج	پلاست برگ و خوشه	نیپون سودا ژاپن	WP	%۷۲/۵	ویستا	تیوفانات متیل + تری سیکلازول	۵۶
۹۷/۶/۲۷	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	زنگ زرد	ب آس اف	SC	%۴۷/۹	رکس دو	تیوفانات متیل + اپوکسی کونازول	۵۷
۸۹/۳/۱۰	۲۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	جو	سیاهک آشکار	سینجننا	FS	%۳/۶۳	دیویدند استار	دیفنوکونازول + سایپرو کونازول	۵۸
۸۹/۹/۱	۱۰۰ میلی لیتر برای یکصد کیلوگرم بذر	-	گندم	سیاهک آشکار	سینجننا	FS	%۳/۶۳	دیویدند استار	دیفنوکونازول + سایپرو کونازول	
۹۷/۸/۱۴	۱ در هزار (عدم کاربرد بیش از دو نوبت در طول یک فصل)	-	خیار در شرایط گلخانه‌ای	سفیدک پودری	سینجننا	DC	%۱۴	سیدلی تاپ	دیفنوکونازول + سیفلوفنامید	۵۹
۹۴/۱۲/۱۰	۲ لیتر در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	آلترناریا	ب آساف	EC	%۱۱/۲	کابریو دو	دیمتومورف + پیراکلوستروبین	۶۰
۹۴/۸/۲۵	۲ کیلوگرم در هکتار	۷ روز	سبب زمینی	سفیدک داخلی	ب آس اف	WG	%۶۹	آکروبات ام زد	دیمتومورف + مانکوزب	۶۱
۹۴/۳/۱۱	۱ لیتر در هکتار	-	ساقه کلزا	پوسیدگی اسکلروتنيایی	سینجننا	SC	%۴۲	آلتو کمبی	سایپروکونازول + کاربندازیم	۶۲
۹۱/۳/۸	۰/۵-۰/۴ در هزار	۳ روز	- خیار گلخانه	سفیدک داخلی	ایشیهارا	SC	%۴۰	رانمن	سیازوفامید	۶۳
۹۴/۷/۶	۱۵۰ میلی لیتر در	-	سبب زمینی	سفیدک داخلی	ایشیهارا	SC	%۴۰	رانمن	سیازوفامید	

## قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

	هکتار										
۹۶/۵/۲	۱/۵ در هزار	روز ۳	- خیار گلخانه	سفیدک داخلی	ایشیهارا	SC	%۱۰	رانمن	سیازوفامید		۶۴
۹۷/۱۰/۱۷	۰/۶ در هزار(بیش از سه نوبت متوالی و بیش از شش نوبت در یک دوره تولید ممنوع است).	-	خیار(گلخانه)	سفیدک کرکی	شاندوگ هایلر (بازرگانان سرای سپند پارس)	SC	%۲۰	رگنانت	سیازوفامید		۶۵
۹۲/۴/۱۷	۳ کیلوگرم در هектار	روز ۱	خیار	سفیدک پودری	بیسترفیلد	WG	%۸۰	سولفولاک	سولفور		۶۶
۹۲/۸/۲۷	۲/۵ در هزار	-	انگور	سفیدک پودری	سمیران	SC	%۸۰	گوگرد سمیران	سولفور		۶۷
۹۳/۶/۱۰	۳/۷۵ در هزار	روز ۲۰	شلیل	سفیدک پودری	ارکیده سازان	SC	%۴۰	سولفور ارکیده سازان	سولفور		۶۸
۹۸/۱۰/۹	۳ در هزار	-	توت فرنگی	کپک خاکستری	رهوان رویش سبز	SP		سراکوئینت	سولفات مس + فسفیت پتابسیم		۶۹
۹۷/۱۲/۱۳	۴ کیلوگرم در هектار(مزرعه)	-	پیاز	سفیدک دروغی	خرز سم کود Zhejiang Sega	WG	%۵۲/۵	اکولایزر	فاموکسادون + سیموکسانیل		۷۰
۹۷/۱۰/۱۷	۳ لیتر در هектار(در تناوب با قارچ کش های رایج)	-	سنبله گندم	فوزاریومی	جیانگ سو (کیمیا سبزینه پویا)	SC	%۲۵	لیانگدی	فناماکریل		۷۱
۹۲/۱۲/۵	۲/۵ در هزار	روز ۳۰	پسته	گموز	شاندونگ داچنگ	WG	%۸۰	الیت	فووتیل آلمینیوم		

## قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

۹۶/۵/۲	۲ در هزار	۱۴ روز	مرکبات	گموز	دوگال	WP	%۸۰	رودر	فوزتيل آلومينيوم	۷۲
۹۵/۸/۲۴	۲-۲/۵ در هزار بسته به شدت بیماری در سه نوبت	۷ روز	انگور	سفیدک داخلی	باير آ گ	WG	%۷۱/۱	پروفایلر	فوزتيل آلومینیوم + فلوپیکولید	۷۳
۸۷/۵/۲	۰/۲ در هزار	۴ روز	کدوئیان	سفیدک پودری	ب آ اس اف	WG	%۵۰	استروبوی	کروزکسیم متیل	۷۴
۹۸/۴/۱۰	نیم در هزار	-	خیار(گلخانه و فضای باز)	بوته میری	پروبلت فیتو اسپانیا (سبا کوشک شت)	SL	%۳۷/۵	بلتانول	کینوسول	۷۵
۹۷/۱۰/۱۷	۰/۷ در هزار(استفاده بیش از دو نوبت متوالی و بیش از چهار نوبت در یک دوره تولید ممنوع است.	۱ روز	خیار(گلخانه)	سفیدک کرکی	سینجنتا	SC	۵۰	کاریال استار	ماندی پروپامید + دیفنوکونازول	۷۶
۹۳/۴/۲	۳۰ گرم در یک لیتر آب و کاربرد به روش رنگ آمیزی	-	مرکبات	گموز	ماسو	WP	%۶۵	آلادوسی تی ال	مانکوزب + کلروتالونیل + سیمو کسانیل	۷۷
۹۷/۹/۲۶	۱/۳ در هزار ( به صورت تناوبی با قارچ کش های دیگر)	-	سیب درختی	لکه سیاه	ناگارجونا اگری کم (سیمز محصول داتیس)	WP	%۴۰	آتیس	مایکلوبوتانیل	۷۸
۸۶/۸/۲۸	۷ گرمی برای نگهداری ۵	-	انگور	بیماریهای قارچی	اروم زرین خوش	پد کاغذی	۷ گرم متا	سولفور پد	متا بی سولفات سدیم	۷۹

## قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

	کیلوگرم انگور						بیسولفیت			
۹۶/۴/۱۹	۲ در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۲۰۰ گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۷ روز	خیار	بوته میری در مزرعه و گلخانه	گیاه	WP	٪.۷۲	داونی جی	متالاکسیل + مانکوزب	۸۰
۹۳/۲/۱۵	۲ در هزار در مزرعه به صورت محلول ریزی پای بوته و در گلخانه به منظور ضد عفونی خاک جهت کنترل عامل بیماری فوق به مقدار ۲۰۰ گرم در هر متر مکعب خاک به صورت مخلوط با خاک	۷ روز	خیار	بوته میری در مزرعه و گلخانه	بهار و شیمی	WP	٪.۷۲	رزالاکسیل	متالاکسیل + مانکوزب	۸۱
۹۴/۷/۶	۳ کیلوگرم در هکتار	۷ روز	سبب زمینی	سفیدک داخلی	بهار و شیمی	WP	٪.۷۲	رزالاکسیل	متالاکسیل + مانکوزب	
۹۵/۶/۲۹	۳-۴ در هزار	صفر روز	- خیار - گلخانه	سفیدک داخلی	J I Biotech	SL	٪.۵۳	فسفایت	مونو و دی پتاسیم اسیدفسفونیک	۸۲

## قارچ کش های تصویب (ثبت) شده از سال ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۹۸

۹۵/۱۰/۲۷	قبل از انتقال نشاء یک در هزار، یک هفته بعد از انتقال نشاء دو در هزار و دو هفته پس از سمپاشی دوم به مقدار ۲ در هزار	۱۰ روز	گوجه فرنگی	پژمردگی فوزاریمی	Mitsui	SL	%۳۰	تاچی گارن	های مکسازول	۸۳
۹۸/۴/۱۰	۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب	-	خیار(گلخانه و فضای باز)	بوته میری	سینجنتا	EC	%۴۴/۶	یونیفورم	مفتوکسام+آزوکسی استروبین	۸۴
۹۶/۸/۲۹	مزروعه: ۱۰ در هزار گلخانه: ۷/۵ در هزار	-	خیار	سفیدک پودری	JH.biotech	SL	-	میلدی کیور	عصاره گیاهی	۸۵